

نشریه علمی- ترویجی یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
جلد ۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۲

تربت، رقم جدید چندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا مناسب کشت در شمال شرق کشور

سعید واحدی^۱، محسن آقایی‌زاده^۱، محمدرضا اوراضی‌زاده^۱، حسنعلی شهبازی^۲، جمشید سلطانی^۳، غلامرضا اشرف، مصباح^۱ سعید صادق‌زاده حمایتی^۱، محمود، مطلوبی^۳ منصوری^۱، فرشید داریوش فتح‌الله طالقانی^۱، سیدباقر محمودی^۱، سعید دارابی^۱، اباذر رجبی^۱، مهدی حسنی^۴، محسن بذرافشان^۲، پیمان نوروزی^۱، علیرضا قائمی^۲، جهانشاه بساطی^۲، شهرام خدادادی^۳، علی حبیب خدایی^۳، محمدرضا فتحی^۳، حمید نوشاد^۱، محمد عبداللهان نوqایی^۱، محمدعلی چگینی^۱، مژده کاکویی عرب نژاد^۱، سیدمرتضی‌زاده^۳ و کیوان فتوحی^۳

- ۱- اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چندرقند، کرج
- ۲- اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، فارس، کرمانشاه و میاندوآب
- ۳- کارشناسان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چندرقند، کرج
- ۴- کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۴/۱۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۳/۲۵

چکیده

واحدی س، آقایی‌زاده م، اوراضی‌زاده م، شهبازی ج، اشرف‌صادق‌زاده حمایتی س، مصباح م، ف منصوری غ، ر، مطلوبی حبیب، ش خدادادی، ج، قائمی ع، ل، بساطی، پ، بذرافشان م، نوروزی م، فتح‌الله طالقانی د، محمودی س، ب، دارابی س، رجبی ا، حسنی چگینی م ع، کاکویی نژاد م، عرب م، نوqایی نوشاد ج، عبداللهان نوqایی، ر فتحی، ع خدایی‌زاده س، م، فتوحی ک (۱۳۹۲) تربت، رقم جدید چندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا مناسب کشت در شمال شرق کشور. نشریه یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی ۲ (۴): ۲۹۹-۳۱۰.

بیماری ویروسی زردی نکروتیک رگبرگ چندرقند (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) یا ریزومانیا یکی از مهم‌ترین و مخرب ترین بیماری‌های دنیا است. این بیماری (*Beta vulgaris* L.)-های چندرقند عامل محدود کننده زراعت چندرقند در استان‌های مختلف کشور محسوب می‌منظور تهیه رقم مقاوم که شود. به بهترین روش مبارزه با بیماری است در سال ۱۳۸۱، ژرمنر^۱، W114^۲، پلاسم حامل ژن مقاوم به ریزومانیا (جمعيت برنامه کشت انتخابی قرار گرفت. در سال ۱۳۸۲، از هر بوته انتخابی بذر فamilی تمام خواهی تهیه شد. در سال هر یک از فamilی‌ها با یک پایه مادری تلاقی شدند. در سال ۱۳۸۵ طی ارزیابی محسولی در خزانه بیماری، ۱۳۸۳، به عنوان برترین هیبرید شناسایی شد. SB37 × SHR02-P.4 استان فارس، یکی از هیبریدهای تولیدی با ترکیب نام منظور ارزیابی تکمیلی در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در شرایط گذاری و به این هیبرید با کد آلودگی طبیعی از نظر مقاومت به بیماری و همچنین صفات محسولی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تجزیه مرکب نشان داد هیبرید فوق با عملکرد ریشه ۲۶/۱۲ گن^۳ در هکتار اختلاف معنی‌داری با عملکرد ریشه رقم شاهد حساس (جلگه، ۴۱/۰۸ گن در هکتار) و شاهد متحمل داخلی (رقم زرقان، ۴۹/۱۲ گن در هکتار) داشت. برتری نسبی این هیبرید در استان خراسان نسبت به ارقام داخلی زرقان و پارس در آزمایش‌های تحقیقاتی در حوزه عمل کارخانه‌های قند استان خراسان و مزارع تحقیقی - ترویجی این استان و همچنین فراوانی حضور ژن مقاوم در ۷۰ درصد از بوته‌های این هیبرید، با توجه به تنوع ژنتیکی بالای عامل بیماری در استان‌های خراسان، این هیبرید را مناسب کشت در شمال شرق کشور ساخته است و به نام تربت نامیده شد. هیبرید منوژرم دیلویید «تربت» مناسب کشت بهاره چندرقند در مناطق آلوده به بیماری ریزومانیاست.

واژه‌های کلیدی: تربت، چندرقند، رقم مقاوم و ریزومانیا.

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول: sdvahedi@yahoo.com

مقدمه

استان خراسان (۱۲) گزارش شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد واکنش ارقام مقاوم در این استان متفاوت باشد.

در حال حاضر تخمین زده می‌شود بیش از سی هزار هکتار از مناطق چغندرخیز کشور کم و بیش با عارضه بیماری ریزومنیا روپرتو هستند. که این مقدار هر ساله رو به افزایش است. کشاورزان چغندرکار برای جلوگیری از وقوع خسارت، همه ساله اقدام به درخواست و ورود بذر خارجی مقاوم به ریزومنیا می‌کنند که سالیانه بر اساس نیازهای اعلام شده، معادل ۱۵۰-۱۰۰ هزار واحد بذر مقاوم از کشورهای هلند، سوئد، آلمان و فرانسه وارد کشور می‌شود.

جدا از مشکلات ثبت سفارش بذر و ارسال به موقع آن که برخی موقع موجب می‌شود بذر دیر به دست زارع برسد و موجب تأخیر در زمان کاشت می‌شود - مبلغ هنگفتی نیز بایستی جهت خرید و انتقال بذر به داخل کشور پرداخت شود. با توجه به ورود بیش از یکصد هزار واحد بذر خارجی و متوسط قیمت ۸۰ یورو برای هر واحد، جهت تأمین بذر مقاوم به ریزومنیا هر ساله حدود هشت میلیون یورو ارز از کشور خارج می‌شود. با فرض جایگزینی رقم مقاوم داخلی به جای حداقل ۳۰ درصد از رقم‌های خارجی مقاوم به ریزومنیا، بیش از دو میلیون یورو صرفه جویی ارزی نصیب کشور خواهد شد. با فرض قیمت هر یورو معادل ۴۰۰۰ ریال و با در نظر گرفتن قیمت فروش هر واحد بذر مقاوم داخلی، که

بیماری ویروسی ریزومنیا (ریشه‌ریشی) یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های چغندرقند محسوب می‌شود (۹). این بیماری اولین بار در سال ۱۹۵۹ از ایتالیا گزارش شد (۸) و سپس در بسیاری از نقاط دنیا از جمله فرانسه (۱۹۷۲)، ژاپن (۱۹۷۳)، آمریکا (۱۹۸۳) و دیگر کشورها گزارش شد (۱۱). در سال ۱۹۷۳، عامل بیماری در ژاپن شناسایی و به نام ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) نام بیماری ریزومنیا در حال گذاری شد (۱۶).

حاضر مهم‌ترین بیماری چغندرقند در سطح دنیا محسوب می‌شود (۱۵) و از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه موجب کاهش شدید عملکرد قند در هکتار می‌شود (۱۳). خسارت این بیماری در ارقام حساس معمولاً بیش از ۸۰ درصد و در مواردی به صد درصد نیز می‌رسد (۶).

این بیماری اولین بار در ایران در سال ۱۳۷۵ (۲ و ۳) از استان فارس گزارش شد و متعاقب آن شروع بیماری در اکثر نقاط چغندرکاری کشور گزارش شد (۴). کاشت ارقام مقاوم، بهترین و تنها راه مبارزه مؤثر با بیماری محسوب می‌شود (۱۰، ۱۷ و ۷).

گزارش‌های منتشر شده طرح پراکنش بیماری ریزومنیا در کشور حکایت از آلودگی ۳۵ درصد مزارع چغندرقند دارد، از سوی دیگر نوع ژنتیکی بالایی از ویروس عامل بیماری از

مواد و روش‌ها

در سال ۱۳۸۱ توده گردهافشان حامل ژن مقاوم به بیماری ریزومانیا موجود در بانک ژن مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر چندرقند در مزرعه تحقیقاتی کرج (W114) جمعیت (کشت و جهت زمستان گذرانی به سیلو منتقل شد. در بهار سال ۱۳۸۲ تعداد ۲۸ بذر تمام خواهی تولید شد و در سال ۱۳۸۳ بذر فامیل‌های حاصل به عنوان پایه پدری، با یک پایه مادری نر عقیم تلاقی و بذر هیرید حاصل استحصال شد. طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۷ هیریدهای حاصل به همراه شاهدهای مقاوم داخلی (زرقان) و خارجی (ریزوفورت و دوروتی) و همچنین یک شاهد حساس (رسول) در خزانه بیماری واقع در ایستگاه تحقیقاتی زرقان فارس مورد مقایسه محصولی قرار گرفتند. آزمایش‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. براساس نتایج ارزیابی مقدماتی مزرعه‌ای مشخص شد بهترین هیرید که در ادامه با کد SBSI006 رهگیری شد از مقاومت و وضعیت عملکردی مطلوبی برخوردار بود. در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ در منطقه خراسان (تریت جام) و در خزانه بیماری در کنار چند شاهد داخلی و خارجی مقاوم و همچنین شاهد حساس مورد ارزیابی محصولی قرار گرفت. هیرید طی سال‌های ۹۱-۹۰ نیز SBSI006 جدید جهت بررسی سازگاری در آزمایش‌های مختلف آماری مورد ارزیابی محصولی قرار

حدود ۸۵۰ هزار ریال است. صرفه‌جویی ریالی حاصل از جایگزینی هیرید جدید با بذر مقاوم خارجی، معادل $\frac{9}{3}$ میلیارد ریال خواهد بود؛ که این مبلغ را می‌توان صرف توسعه کشت، بازسازی کارخانه‌های قند و مکانیزاسیون اراضی، توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار، خرید ماشین‌آلات و انجام پژوهش‌های کاربردی کرد پس از اولین گزارش‌های مربوط به بیماری در کشور، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چندرقند اقدام به ارزیابی ژرم پلاسم داخلی به منظور دستیابی به منابع مقاومت نمود و به دنبال دستیابی به یک توده گردهافشان حامل ژن مقاومت و گزینش تک بوته‌هایی با مقاومت نسبی در خزانه بیماری و بذرگیری از آنها در قطعات ایزوله، اولین مواد متتحمل به بیماری به دست آمد که حاصل آن معرفی رقم متحمل زرقان در سال ۱۳۸۶ بود (۵). به دلیل گستردگی بیماری در شرق و غرب کشور، پروژه‌های متعددی در راستای اصلاح ارقام مقاوم به اجرا درآمد که منجر به معرفی رقم مقاوم «پارس» در سال ۱۳۹۰ شد که نسبت به رقم زرقان برتری محسوسی از نظر عملکرد داشت (۱). اما به دلیل تنوع ژنتیکی ویروس عامل بیماری در خراسان نیاز به اصلاح رقمی مقاوم تر برای شرق (۱۲) قبولی نیز تولید کند. کشور بود که محصول قابل به همین دلیل بررسی‌هایی انجام شد که منجر به معرفی رقم تربت مناسب شرایط شمال شرق کشور گردید.

بود که به ترتیب با هیریدهای SH02-P.9 × ۲۰۵۰۷ (۴/۴۴ تن در هکتار)، SH02-P.4 × ۲۰۵۰۷ (۳/۸۱ تن در هکتار)، SH02-P.15 × ۲۰۵۰۷ (۳/۵۰ تن در هکتار) و SH02-P.12 × ۲۰۵۰۷ (۳/۲۵ تن در هکتار) در گروه آماری مشابهی قرار گرفتند. شایان توجه است که در این آزمایش، عملکرد شکر رقم شاهد مقاوم داخلی (زرقان) معادل ۱/۴۱ تن در هکتار بود (جدول ۱).

جدول ۱- مقایسه میانگین عملکرد ریشه و شکر هیریدهای مورد بررسی در ایستگاه زرقان (سال ۱۳۸۵)

نحوی	عملکرد شکر (تن در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	عملکرد شکر (تن در هکتار)
۲/۷۹bcde	۳۰/۱۲cde	20507×SH02-P.1	
۲/۲۶cde	۲۳/۰۴ed	20507×SH02-P.2	
۲/۸۱ab	۳۹/۸fаб	20507×SH02-P.4	
۲/۳۶bcde	۲۲/۸۸e	20507×SH02-P.5	
۲/۹۶bcd	۳۴/۰۸bcd	20507×SH02-P.6	
۲/۸۸bce	۲۸/۶۸cde	20507×SH02-P.7	
۲/۳۳bcde	۷۷/۹۶cde	20507×SH02-P.8	
۴/۴۴a	۴۱/۶۷a	20507×SH02-P.9	
۲/۴۶bcde	۳۳/۳۶bcde	20507×SH02-P.10	
۲/۶۰bcde	۲۸/۹۲cde	20507×SH02-P.11	
۲/۲۵abcd	۳۶/۸۵ab	20507×SH02-P.12	
۲/۲۴cde	۲۳/۱۶ed	20507×SH02-P.13	
۱/۱۳de	۲۳/۱۶f	20507×SH02-P.14	
۲/۵abc	۲۶/۶bcde	20507×SH02-P.15	
۲/۳۳bcde	۲۳/۰۴cde	20507×SH02-P.16	
۲/۸۴bcde	۲۸/۰۸cde	20507×SH02-P.17	
۱/۴۱e	۷۷/۹۶f		زرقان
۴/۶۳a	۱۲/۰۴a		دوروتی
۴/۵۲a	۴۴/۵۲a		ریزوفوت

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشد بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح اختصار پنج درصد اختلاف معنی دار ندارند.

توضیح اینکه شاهد حساس در مقایسه میانگین قرار نگرفت.

براساس نتایج سال ۱۳۸۵، دو لاین SHR02-P.4 و SHR02-P.9 هیریدهای حاصل از این پژوهشی‌ها به همراه

گرفت. در نهایت صفات عملکرد ریشه، درصد فقد، محصول شکر و سایر خصوصیات تکنولوژیکی چغندر قد بر اساس روش‌های استاندارد و متداول در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قد تعیین و مورد تجزیه و تحلیل آماری گرفت.

نتایج و بحث

ارزیابی مقدماتی هیریدهای (سال ۱۳۸۵)

در سال ۱۳۸۵ شدت آلودگی مزرعه در حدی بود که شاهد حساس به طور کامل از بین رفت و قابل برداشت نبود. نتایج (جدول ۱) نشان داد از بین هیریدهای مورد بررسی، هیریدهای شماره ۲۰۵۰۷ × SH02-P.12، ۲۰۵۰۷ × SH02-P.9 و ۴۱/۶۷ × SH02-P.4 به ترتیب با ۳۶/۸۵ و ۳۶/۸۴ تن در هکتار عملکرد ریشه ۳۹ جزو بهترین هیریدهای بودند. لازم به ذکر است پایه مادری ۲۰۵۰۷ به عنوان نر عقیم تک جوانه متحمل بود. عملکرد ریشه این هیریدهای میانگین عملکرد شاهدهای مقاوم خارجی شامل رقم دوروتی (۴۴/۵۲ تن در هکتار) و ریزوفورت (۴۵/۹۶ تن در هکتار) در یک گروه آماری قرار گرفت. عملکرد رقم شاهد مقاوم داخلی (۱۲/۸۴ تن در هکتار) بسیار کمتر از هیریدهای منتخب بود (جدول ۱).

عملکرد شکر در هیریدهای شاهد خارجی دوروتی (۴/۶۳ تن در هکتار) و ریزوفورت (۴/۵۲ تن در هکتار) از برتری آماری برخوردار

۹/۱۲ تُن در هکتار، اختلاف معنی داری با رقم های شاهد مقاوم خارجی دوروتی (۱۰/۱۶ تُن در هکتار) و تو س (۹/۷۶ تُن در هکتار) نداشتند (جدول ۲). در سال ۱۳۸۷، هیبرید ۲۰۵۰۷ × SHR02-P.4 که به لحاظ عملکرد ریشه و شکر اختلاف معنی داری با هیبرید ۲۰۵۰۷ × SHR02-P.9 به سایر ویژگی های مطلوب (از جمله شکل ظاهری بوته، واریانس کمتر اندازه ریشه، سرعت جوانه زنی و استقرار) تحت عنوان SBSI006 گُذاری و جهت ادامه روند ارزیابی در برنامه های به نژادی قرار گرفت.

جدول ۲- نتایج ارزیابی هیبریدهای چندرقند در شرایط آلدگی به بیماری ریزومانیا در تربت جام (سال ۱۳۸۷)

	عملکرد	عملکرد	زنو تیپ
شکر (تُن در هکتار)	ریشه (تُن در هکتار)		
۸/۲۴bcde	۵۲/۷۷bcd	20507×SHR01-P.2	
۸/۶۸abcd	۵۳/۹۰bcd	20507×SHR01-P.12	
۸/۲۸bcde	۵۴/۱۲bcd	20507×SHR01-P.13	
۷/۵۰cde	۵۱/۰۵cde	20507×SHR01-P.20	
۶/۹۰e	۴۵/۲۴de	20507×SHR02-P.2	
۹/۰۷abc	۶۱/۲۹ab	20507×SHR02-P.4	
۸/۴۸bcde	۴۵/۷۹bc	20507×SHR02-P.8	
۹/۱۲abc	۶۱/۶.ab	20507×SHR02-P.9	
۸/۵۷a-e	۵۱/۵.cde	20507×SHR03-P.2	
۸/۴۱bcde	۵۲/۳۱bcde	20507×SHR03-P.12	
۷/۸۶cde	۴۷/۴۵cde	20507×SHR03-P.26	
۷/۶۵cde	۴۸/۸۵cde	(7112×436)×(20543×FC709)	
۷/۲۸de	۴۸/۲۶cde	(7112×436)×(20448×Doro)	
۶/۹۹de	۴۳/۷۸e	(7112×436)×(20543×Doro)	
۸/۲۹bcde	۵۱/۴۷cde	(7112×436)×(20548×Doro)	
۳/۳۱f	۲۳/۰۵f	رسول (شاهد حساس)	
۱۰/۱۶a	۶۴/۲۸a	دوروتی (شاهد مقاوم خارجی)	
۹/۷۶ab	۵۱/۰۵cde	تو س (شاهد مقاوم خارجی)	

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشدند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی دار ندارند.

تعداد دیگری از هیبریدهای امیدبخش مقاوم به ریزومانیا، در سال های بعد مورد مقایسه محصولی قرار گرفتند.

ارزیابی هیبریدهای بورتر (سال ۱۳۸۷)

در سال ۱۳۸۷، دو هیبرید برتر انتخابی از برسی و ۲۰۵۰۷ × SHR02-P.4 (های مقدماتی ۲۰۵۰۷ × SHR02-P.9) به همراه دوازده (۲۰۵۰۷ × SHR02-P.9) هیبرید امیدبخش دیگر، دو شاهد خارجی مقاوم (دوروتی و تو س) و یک شاهد حساس (رسول) داخلی در خزانه بیماری ریزومانیا در منطقه تربت جام استان خراسان رضوی بررسی شد. نتایج نشان داد که عملکرد ریشه شاهد حساس (رسول)، ۲۳/۰۵ تُن در هکتار بود (جدول ۲). از بین دو هیبرید مورد نظر، هیبرید حاصل از لاین SHR02-P.4 (هیبرید منتخب) با عملکرد ریشه معادل ۶۱/۲۹ تُن در هکتار، بیشترین عملکرد ریشه را در بین هیبریدهای مورد آزمون به خود اختصاص داد. هیبرید ۲۰۵۰۷ × SHR02-P.9 معنی دار (۶۰/۶۰ تُن در هکتار) بعد از هیبرید منتخب قرار گرفت. هیبرید منتخب ۲۰۵۰۷ × SHR02-P.4 با عملکرد ریشه شاهد خارجی برتر (دوروتی) (۶۴/۲۸ تُن در هکتار) در سطح آماری مشابهی قرار گرفت (جدول ۲).

از نظر عملکرد شکر نیز هیبریدهای ۲۰۵۰۷ × SHR02-P.9 و ۲۰۵۰۷ × SHR02-P.4 به ترتیب با تولید عملکرد شکر معادل ۹/۰۷ و

رقم شاهد متحمل داخلی (زرقان)، هیرید SBSI006 (تریت) به ترتیب با اختلاف عملکرد ریشه و شکر معادل ۱۰ و ۱/۳۲ تن در هکتار نشان از برتری معنی دار داشت (جدول ۳)

جدول ۳- نتایج ارزیابی هیرید چغدرقد در شرایط آلدگی به بیماری ریزومانیا در تربت جام (سال ۱۳۸۸)

عملکرد شکر (تن) در هکتار)	عملکرد ریشه (تن) در هکتار)	عنوان ژنوتیپ (شاهد مقاوم داخلی) زرقان (شاهد حساس) جلگه (شاهد مقاوم) دوروتی F-20701 F-20702 F-20739 F-20693 F-20692 F-20713 F-20714 20507×SHR01-P.12 SBSI006 (تریت)
۶/۳۶c	۴۹/۰۵b	(شاهد مقاوم داخلی) زرقان
۲/۷۱d	۲۶/۱۷c	(شاهد حساس) جلگه
۸/۱۱abc	۶۳/۶۷ab	(شاهد مقاوم) دوروتی
۸/۰۸abc	۵۴/۷۹ab	F-20701
۷/۹۱abc	۶۹/۵۵a	F-20702
۱۰/۳۷a	۶۵/۱۹ab	F-20739
۸/۰۲abc	۵۲/۱۰ab	F-20693
۸/۳۳abc	۵۹/۲۱ab	F-20692
۹/۲۸ab	۶۲/۲۹ab	F-20713
۹/۳۶ab	۶۹/۹۹a	F-20714
۶/۹۴bc	۵۷/۸۶ab	20507×SHR01-P.12
۷/۶۸abc	۵۹/۹۰ab	SBSI006 (تریت)

میانگین‌هایی، در هر سنتون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می‌باشد بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی دار ندارند.

ارزیابی هیرید SBSI006 (تریت) در پایلوت شمال شرق کشور - تربت جام (سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰)

هیرید جدید SBSI006 (تریت) در سال‌های ۱۳۸۹-۹۰ در آزمایشی (جدول ۴) در خزانه بیماری ریزومانیا تربت جام در استان خراسان به همراه ارقام شاهد مقاوم خارجی (توس) و داخلی (زرقان) و رقم شاهد حساس

ارزیابی هیریدهای گزینش شده (سال ۱۳۸۸) در سال ۱۳۸۸، هیرید SBSI006 به عنوان یکی از ارقام مورد آزمایش بررسی ارقام داخلی و خارجی در خزانه بیماری ریزومانیا در منطقه تربت جام مجدداً آزمایش شد. بیشتر ارقام این آزمایش، رقم‌های خارجی بودند که به منظور دریافت مجوز واردات تحت گذ مورد آزمون قرار گرفتند. در این آزمایش، از رقم دوروتی به عنوان شاهد مقاوم خارجی، رقم زرقان، به عنوان شاهد متحمل داخلی و رقم جلگه به عنوان شاهد حساس استفاده شد. آزمایش دارای دوازده تیمار و چهار تکرار بود که در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد.

عملکرد ریشه شاهد حساس (۷۶/۲۶ تن در هکتار) نشانگر آلدگی مزروعه انتخابی بود (جدول ۳). به طوری که تفاوت عملکرد ریشه بهترین رقم (F-20702) و شاهد حساس برابر ۴۳/۳۸ تن در هکتار بود. با توجه به اینکه آزمایش به ارزیابی ارقام خارجی اختصاص داشت، عملکرد بسیاری از تیمارها بالا بود و فقط یک یا دو تیمار عملکرد پایینی داشتند. در این آزمایش، عملکرد ریشه (۵۹/۹۰ تن در هکتار) و شکر (۷/۶۸ تن در هکتار) هیرید SBSI006 از نظر آماری تفاوت معنی داری با رقم شاهد خارجی مورد استفاده (رقم دوروتی) به ترتیب با عملکرد ریشه و شکر معادل (۶۳/۶۷ و ۸/۱۱ تن در هکتار) نشان نداد (جدول ۳). این در حالی بود که در مقایسه با

جدول ۴- نتایج ارزیابی عملکرد ریشه و شکر هیرید جدید چغدرقند در شرایط آلوگی به بیماری ریزومنیا در تربت جام (میانگین دو ساله ۱۳۸۹-۱۳۹۰)

ژنوتیپ	عملکرد شکر (تن در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)
۶/۹۰bc	۶۷/۱۹ab	(436×KWS)×27068(Sh-HSF-1)
۷/۴۲b	۷۰/۷۰ab	(436×KWS)×27068(Sh-HSF-79)
۶/۷۵bc	۶۹/۹۲ab	(7112×KWS)×27068(Sh-HSF-79)
۶/۸۱bc	۶۶/۰۳ab	(FC708×KWS)×27068(Sh-HSF-79)
۵/۱۶c	۵۶/۶۶bcd	(436×KWS)×27068(Sh-HSF-30)
۶/۸۹bc	۶۲/۳۴abc	(FC708×KWS)×27068(Sh-HSF-30)
۷/۵۱b	۷۰/۱۷ab	(FC708×KWS)×27068(Sh-HSF-47)
۶/۹۰bc	۶۳/۸۵abc	(FC708×KWS)×27068(Sh-HSF-2)
۷/۱۳b	۶۸/۸۵ab	(436×KWS)×27068(Sh-HSF-8)
۶/۷۵bc	۶۱/۶۲abc	(FC708×KWS)×27068(Sh-HSF-8)
۴/۴۸d	۴۱/۰۸d	جلگه
۶/۰۵cd	۴۹/۲۲cd	زرقان
۶/۳۴bc	۵۷/۲۰bc	(7112×436) × (20448×Doro)
۶/۷۶bc	۶۳/۸۶abc	(7112×SB36) × SHR01-P.12
۷/۱۹b	۷۶/۱۲a	تریت
۱۱/۰۱a	۷۶/۱۹a	توس

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی دار ندارند.

سال، قابل اطمینان و ناشی از مقاومت بهتر و پتانسیل تولید عملکرد ریشه بیشتر این هیرید بود.

عملکرد شکر هیرید تربت ۷/۱۹ (تن در هکتار) به نحو معنی داری بیش از محصول شکر رقم متholm زرقان (۶/۰۵ تن در هکتار) بود. شایان ذکر است، بیشترین مقدار محصول شکر در این آزمایش، به رقم شاهد خارجی (توس) با مقدار ۱۱/۰۱ تن در هکتار اختصاص داشت که اختلاف معنی داری با رقم تربت نشان داد (جدول ۴).

(جلگه) مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. اثر مقابل سال × رقم برای هیچ یک از صفات مورد نظر معنی دار نشد. بر اساس نتایج مقایسه میانگین (جدول ۴)، هیرید تربت با عملکرد ریشه معادل ۷۶/۱۲ تن در هکتار تفاوت معنی داری با رقم زرقان (۴۹/۲۲ تن در هکتار) داشت. این در حالی است که اختلاف معنی دار آماری بین عملکرد ریشه هیرید تربت با رقم شاهد مقاوم خارجی (توس، ۷۶/۱۹ تن در هکتار) وجود نداشت. برتری هیرید تربت نسبت به رقم زرقان طی دو

قرار گرفت (جدول ۵)

در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش‌ها، حکایت از پتانسیل خوب هیرید تربت در شرایط آلودگی به بیماری ریزومانیا در مناطق شمال شرق داشت و نشان داد این هیرید می‌تواند شرایط بحرانی ناشی از بیماری ریزومانیا را در شمال شرق کشور - که موجب کاهش عملکرد شکر رقم متحمل پارس شده است به خوبی تحمل کند

آزمایش تحقیقی- ترویجی در شمال شرق
کشور

با توجه به واکنش مناسب رقم تربت در خزانه بیماری ریزومانیا در مناطق شمال شرق نسبت به سایر مناطق کشور، تصمیم به ارزیابی عملکرد این هیرید در شرایط زارعین منطقه شد (جدول ۶).

رقم‌های داخلی و خارجی تحت شرایط آلودگی طبیعی به بیماری ریزومانیا مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند و از رقم جلگه به عنوان رقم شاهد حساس آزمایش استفاده شد. ارقام خارجی مورد استفاده جزو رقم‌های بودند که توسط کارخانه‌های قندوارد و جهت کشت در اراضی آلوده به بیماری ریزومانیا توزیع می‌شوند. نتایج حاکی از افزایش عملکرد ریشه به میزان ۱۶ درصد در نتیجه کاشت هیرید تربت نسبت به رقم پارس شد (جدول ۶).

ارزیابی هیرید تربت در سه منطقه مشهد، شیراز

و میاندوآب (سال ۱۳۹۱)

هیرید تربت در سال ۱۳۹۱، در آزمایشی در خزانه بیماری مشهد، شیراز و میاندوآب به همراه ارقام شاهد خارجی مقاوم (توس، ایزلا و ماندارین)، رقم شاهد داخلی مقاوم (پارس) و رقم شاهد حساس (جلگه) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج مقایسه میانگین در سه منطقه مورد آزمایش می‌توان چنین بیان کرد که هیرید تربت با میانگین عملکرد ریشه ۳۹/۴۷ تُن در هکتار در مقایسه با عملکرد ریشه هیرید مقاوم داخلی پارس (۳۳/۳۳ تُن در هکتار) از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند اما در منطقه مشهد، هیرید تربت با عملکرد ریشه ۴۵/۸۴ تُن در هکتار اختلاف معنی‌داری با رقم پارس (۲۸/۸۵ تُن در هکتار) داشت و حتی توانست با رقم‌های مقاوم خارجی (توس و ماندارین) در گروه آماری مشابه قرار گیرد (جدول ۵).

میانگین عملکرد شکر هیرید تربت ۶۰/۲ تُن در هکتار) با عملکرد شکر رقم مقاوم پارس (۵/۲۴ تُن در هکتار) اختلاف معنی‌دار آماری نشان نداد (جدول ۵) اما در منطقه مشهد، عملکرد شکر هیرید تربت ۷/۶۹ تُن در هکتار) به نحو معنی‌دار (معادل ۲/۸ تُن در هکتار) بیش از رقم پارس (۴/۸۶ تُن در هکتار) شد و با رقم‌های متحمل خارجی ماندارین (۹/۸۶ تُن در هکتار) و توس در گروه آماری مشابه (۹ تُن در هکتار) (۴۴/۹)

جدول ۵- میانگین صفات عملکرد ریشه و شکر هیریدهای چغندرقند در خزانه بیماری ریزومانیا در سه منطقه مشهد، شیراز و میاندوآب (سال ۱۳۹۱)

میانگین		میاندوآب			شیراز			مشهد			نحوه تیپ
عملکرد شکر (تن در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	عملکرد شکر (تن در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	عملکرد شکر (تن در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	عملکرد شکر (تن در هکتار)	عملکرد شکر (تن در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	
۵/۹۸bcd	۳۶/۸۱bcd	۶/۴۱bcd	۴۴/۶۶cd	۴/۷۶bcde	۲۷/۳۷bcd	۶/۷۵de	۳۸/۴۱b-f	(SB37×28874-4)×302-HSF-4-87			
۶/۶۱bcd	۳۹/۲۰bcd	۶/۴۳bcd	۴۱/۴۹cd	۵/۳۴bcde	۳۰/۵۸bc	۸/۱۵bcd	۴۵/۷۷bcd	(28894×28873-33)×302-HSF-4-87			
۶/۹۴bc	۴۴/۶۸b	۸/۱۸abc	۵۸/۹۵abc	۶/۱۵bc	۳۷/۶۰ab	۶/۴۴de	۳۷/۴۹b-f	(7112×SB36)×302-HSF-4-87			
۶/۳۹bcd	۴۰/۳۵bcd	۷/۱۱bcd	۴۸/۸۳bcd	۴/۸-bcde	۲۹/۱۶bcd	۷/۲۶cde	۴۳/۰bcede	(SB37×28874-4)×302-HSF-20-87			
۵/۹۰cd	۳۶/۴۲bcd	۸/۳۱abc	۵۶/۳۷abc	۴/۳۱ed	۱۹/۷۵cd	۶/۰۷def	۳۲/۸۴defg	(28894×28873-33)×302-HSF-20-87			
۵/۸۸cd	۳۷/۴۱bcd	۶/۵۶bcd	۴۹/۶۳bcd	۵/۲۵bcde	۲۹/۳۹bcd	۵/۸۳def	۳۳/۲۰c-g	(7112×SB36)×302-HSF-20-87			
۵/۱۵d	۳۱/۲۳d	۴/۷۲d	۳۳/۳۵d	۵/۱۰bcde	۲۸/۶۸bcd	۵/۶۲def	۳۱/۶۸efg	(SB37×28874-4)×79-HSF-2-88			
۶/۲۸bcd	۳۷/۴۳bcd	۷/۷۳bcd	۴۸/۴۴bcd	۴/۰vcde	۲۲/۱۳cd	۷/۰.۵cde	۴۲/۴۱b-f	(28894×28873-33)×79-HSF-2-88			
۷/۰.۰bc	۲۲/۴۴b	۹/۶۵ab	۶۶/۱.ab	۳/۷۱cde	۲۲/۴۹cd	۷/۶۵bcd	۴۴/۰abcde	(7112×SB36)×79-HSF-2-88			
۵/۹۱cd	۳۶/۵۱bcd	۷/۰.۸bcd	۴۹/۱۳bcd	۴/۷۱bcde	۲۶/۰.۶bcd	۵/۹۵def	۳۴/۳۴cdef	(7112×SB36)×8-HSF-11-88			
۵/۰.۶d	۳۲/۱۶d	۶/۸۲bcd	۴۸/۸۴bcd	۲/۶adf	۱۵/۳۵ed	۵/۶۸def	۳۲/۳.۰defg	(7112×SB36)×8-HSF-13-88			
۶/۰.۰bcd	۳۶/۴۵bcd	۸/۴۹abc	۵۵/۵۸abc	۳/۱۹ed	۱۷/۸۵cd	۶/۳۹de	۳۵/۹۱cdef	(7112×SB36)×Sh-HSF-8			
۶/۷۱bcd	۴۲/۲۷bc	۷/۱۷bcd	۵۵/۶۸abc	۵/۸۱bcd	۳۱/۶۵bc	۷/۱۴cde	۳۹/۴۳b-f	(7112×SB36)×Sh-HSF-79			
۵/۰.۸d	۳۱/۳۵d	۶/۲۴cd	۴۲/۶۸cd	۴/۳۷ed	۲۰/۲۳cd	۵/۶۵def	۳۱/۱۳efg	SBSI004			
۵/۲۲bcd	۳۳/۳۳cd	۶/۲۶cd	۴۱/۸cd	۴/۵۹bcde	۲۹/۲۷bcd	۴/۸۶ef	۲۸/۸۵fg	پارس			
۶/۰.۷bcd	۳۹/۴۷bcd	۶/۷۵bcd	۴۹/۱۳bcd	۳/۶۱cde	۲۳/۴۴bcd	۷/۶۹bcd	۴۵/۸۴bcd	تریت			
۱۰/۴a	۵۹/۳۹a	۱۰/۹۷a	۷۱/۴۹a	۸/۶۰a	۴۷/۴۴a	۱۱/۶۴a	۵۹/۴۸a	ایزلا			
۷/۴۹bc	۴۱/۷۸abc	۵/۹۹cd	۴۱/۴۹cd	۶/۹vab	۳۷/۰.۱ab	۹/۴۴abc	۴۶/۸۴bc	توس			
۷/۰۵b	۴۴/۵۳b	۸/۱۶abc	۵۷/۵۷abc	۴/۶۹bcde	۲۵/۴۷bcd	۹/۸۶ab	۵۰/۵۵ab	ماندارین			
۱/۶۲e	۹/۴۳e	۰/۴۷e	۳/۱۸e	۰/۷۱f	۴/۴۰e	۳/۶۹f	۲۰/۷۱g	جلگه			

میانگین‌هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می‌باشند بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی دار ندارند.

بیماری در حوزه کارخانه‌های قند فریمان، چnarان، نیشابور و آبکوه (واقع در شمال شرق کشور)، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از چهار آزمایش، می‌توان چنین بیان کرد هیبرید جدید با میانگین عملکرد ریشه ۶۳/۲۲ تن در هکتار در مقایسه با میانگین ۶۳ عملکرد ریشه هیبرید مقاوم داخلی پارس از وضعیت مطلوبی (تن در هکتار) (۲۶/۵۹) برخوردار بود و اختلاف معنی‌داری از نظر آماری بین آنها وجود داشت (جدول ۷). بیشترین عملکرد ریشه (۷۰/۸۲ تن در هکتار) به رقم لاتیبا اختصاص داشت. میانگین هیبرید جدید با تعدادی از ارقام مقاوم خارجی (شامل ایزلا، راستا، لودوینا و کاناریا) اختلاف آماری نداشت و در یک گروه قرار گرفت. همچنین نسبت به تعدادی از ارقام خارجی (شامل مراک، روزیزیر، پرمیر، مورالیا و توکانو) برتری آماری نشان داد (جدول ۷).

عملکرد شکر هیبرید تربت (۹/۳۶ تن در هکتار) نیز در مقایسه با رقم مقاوم پارس (۸/۴۵ تن در هکتار) واجد اختلاف معنی‌دار آماری بود (جدول ۷). بیشترین محصول شکر به رقم خارجی ایزابلا (تن در هکتار) (۲۲/۱۲) اختصاص داشت (جدول ۷). برتری هیبرید تربت نسبت به رقم پارس در چهار منطقه مختلف شمال شرق کشور، ثابت، قابل اطمینان و ناشی از مقاومت بهتر و پتانسیل تولید عملکرد ریشه بیشتر این هیبرید در مناطق مورداً آزمایش بود.

جدول ۶- نتایج عملکرد ریشه و عیار قند هیبرید جدید در آزمایش‌های تحقیقی - ترویجی در شمال شرق کشور (سال ۱۳۸۹)

منطقه	رقم	عیار قند (در هکتار)	عملکرد ریشه (تن در هکتار)
استگاه طرق	پارس	۳۸/۳۴	۱۶/۹۴
	تربت	۵۱/۰۰	۱۵/۹۰
	شاهد مقاوم خارجی	۷۰/۶۷	۱۷/۵۰
	پارس	۶۹/۱۰	۱۶/۴۰
شیروان	تربت	۷۳/۲	۱۶/۷۰
	شاهد حساس	۴۶/۶۰	۱۶/۵۰
	شاهد مقاوم خارجی	۹۹/۰۰	۱۷/۵۰
	پارس	۵۳/۳۰	-
چnarان	تربت	۶۱/۰۰	-
	شاهد حساس	۳۸/۵۰	-
	شاهد مقاوم خارجی	۵۵/۰۰	-
	پارس	۵۹/۰۰	-
میانگین	تربت	۶۹/۰۰	-
	شاهد مقاوم خارجی	۸۸/۰۰	-
	پارس	۵۴/۹۴	۱۶/۶۷
میانگین	تربت	۶۳/۵۵	۱۶/۳۰
	شاهد مقاوم خارجی	۷۸/۱۷	۱۷/۵۰

ارزیابی ارقام داخلی و خارجی در چهار منطقه

شمال شرق کشور (فریمان، چnarان، نیشابور و آبکوه)

(سال ۱۳۹۱)

بر اساس واکنش مناسب هیبرید تربت در خزانه بیماری ریزومانیا در استان خراسان نسبت به سایر مناطق کشور و جهت اطمینان از اجرای مناسب رقم در شرایط کشاورزان، مقرر شد ارزیابی عملکرد این هیبرید در شرایط حوزه عمل کارخانه‌های قند شمال شرق کشور نیز در قالب آزمایش‌های تکراردار در برنامه کار قرار گیرد. به همین منظور، در سال ۱۳۹۱، هیبرید تربت به همراه بهترین ارقام خارجی مقاوم و رقم مقاوم داخلی (پارس) در آزمایشی در مناطق آلوده به

جدول ۷- میانگین صفات کمی ارقام مقاوم داخلی خارجی در چهار منطقه فریمان، چnarان، نیشابور و آبکوه (سال ۱۳۹۱)

ردیف	عملکرد ریشه (تن در هکتار)	عملکرد شکر (تن در هکتار)	عيار قند (درصد)	عيار قند (درصد)
۱	۱۲/۲۲a	۱۶/۸۱ef	۶۹/۳۴a	۱۶/۸۱ef
۲	۱۱/۸۲a	۱۶/۱۶g	۶۷/۹۳ab	۱۶/۱۶g
۳	۱۱/۰۶b	۱۷/۳۸c	۶۵/۶۱bc	۱۷/۳۸c
۴	۱۰/۹۸b	۱۵/۷-h	۶۲/۸۰cde	۱۵/۷-h
۵	۱۱/۰۵b	۱۷/۴۷bc	۶۹/۰۹a	۱۷/۴۷bc
۶	۱۰/۶۷bc	۱۷/۶۹ab	۶۰/۱۱efg	۱۷/۶۹ab
۷	۱۰/۷۳b	۱۶/۸۳ef	۶۴/۱۰cd	۱۶/۸۳ef
۸	۱۱/۰۷b	۱۵/۷۱h	۷۰/۸۲a	۱۵/۷۱h
۹	۱۰/۵۵bc	۱۴/۸۶i	۶۲/۲۸def	۱۴/۸۶i
۱۰	۱۰/۵۶bc	۱۶/۶۷f	۶۲/۸۵cde	۱۶/۶۷f
۱۱	۱۰/۱۶cd	۱۷/۷۷ab	۵۸/۱۶g	۱۷/۷۷ab
۱۲	۹/۷۹de	۱۶/۸۴ef	۵۴/۸۳hi	۱۶/۸۴ef
۱۳	۹/۷۴de	۱۷/۷۹a	۵۷/۷۵gh	۱۷/۷۹a
۱۴	۹/۳۶ef	۱۷/۴۸bc	۵۴/۶۶hi	۱۷/۴۸bc
۱۵	۸/۸۱fg	۱۷/۲۲cd	۵۲/۴۳i	۱۷/۲۲cd
۱۶	۹/۳۶ef	۱۶/۹۵de	۶۳/۲۲cde	۱۶/۹۵de
۱۷	۸/۴۵g	۱۴/۸۱i	۵۹/۲۶fg	۱۴/۸۱i
۱۸	۸/۴۰g	۱۶/۸۷ef	۵۳/۴۶i	۱۶/۸۷ef
				SBSI 004

مناسب ترین تاریخ کاشت این رقم اوایل تا اواسط فروردین و تراکم قابل توصیه جهت کشت معادل ۱۲۰ هزار بوته در هکتار در نظر گرفته می شود. نحوه مدیریت آب و میزان مصرف انواع کود در این رقم همانند سایر رقم های متدائل جهت کشت در منطقه است.

توصیه ترویجی

هیرید منوژرم دیپلویید «تریت» (مناسب کشت بهاره چندرقند در مناطق آلوده به بیماری در خراسان است. این هیرید حاصل تلاقی یک پایه گرده افسان دیپلویید مقاوم به بیماری با یک لاین نر عقیم منوژرم مقاوم می باشد. دوره رشد این رقم معادل ۱۸۰ روز است.

منابع

- محسن آقاییزاده (۱۳۹۱) معرفی رقم چندرقند منوژرم هیرید متحمل به ویروس عامل بیماری ریزومانیا. گزارش نامگذاری و آزاد سازی رقم جدید چندرقند. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چندرقند، ۹۱/۴۱۰۲، ۲۷ صفحه
- ایزدپناه ک، هاشمی پ، کامران ر، پاکنیت م، سهندپور آ، معصومی م (۱۳۷۵) وجود گسترده

- بیماری ریشه‌ریشی (شبہ Rhizomania) در فارس. مجله بیماری‌های گیاهی جلد ۳۲: ۲۰۶-۲۰۰
- ۳- توده فلاح م، ارجمند ن، محمودی س ب (۱۳۷۹) بررسی وضعیت آسودگی و پراکنش بیماری ریزومانیا (ریشه گنایی) چندرقند در ایران. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحه ۷۲
- ۴- دارابی س (۱۳۷۷) تشخیص خالص‌سازی و پراکندگی ویروس عامل ریشه گنایی چندرقند (Rhizomania) در فارس و برخی استان‌های دیگر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز. ۱۰۹ صفحه
- ۵- مصباح م (۱۳۸۵) معرفی رقم منوژرم هیبرید مقاوم به ویروس ریزومانیا در چندرقند. گزارش معرفی رقم. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چندرقند، ۵۵۸۲۹/۲۲۲، ۳۳ صفحه
6. Asher MJC (1993) Rhizomania. In: The Sugar Beet Crop, Sci into practice. Chapman & Hall, London, Pp: 311-346
 7. Biancardi E, Lewellen RT, Biaggi MD, Erichsen AW, Stevanato P (2002) The origin of rhizomania resistant in sugar beet. *Euphytica*, 127: 383-397
 8. Canova A (1959) Appunti di patologica della barbabietola. *Inf. Fitopatol.* 9: 390-369
 9. Draycott AP (2006) Sugar beet. Blackwell Publishing Co Ltd, Oxford, UK 514 p.
 10. Harveson R, Rush CM (2002) The influence of irrigation frequency and cultivar blends on the severity of multiple root disease in sugar beets. *Plant Dis.* 86: 901-908
 11. Johanson E (1985) Rhizomania in sugar beet-A threat to beet growing that can be overcome by plant breeding. *Sveriges Utsadesforenings Tidskrift* 95: 115-121
 12. Mehrvar MJ, Valizadeh R, Koenig C, Bragard G (2009) Iranian beet necrotic yellow vein virus (BNYVV): Pronounced diversity of the p 25 coding region in A-type BNYVV and identification of P-type BNYVV lacking a fifth RNA species. *Archive of Virology*, 154(1): 501-506
 13. Putz C, Merdinoglu D, Lemaire O, Stocky G, Valentin P, Wiedemann S (1990) Beet necrotic yellow vein virus, causal agent of sugar beet Rhizomania. Disease Profile. *Rev. Plant Path.* 69: 247-253
 14. Rush CM, Liu, Lewellen HY, RT Acosta-Leal, R (2006) The continuing saga of rhizomania of sugar beets in the United State. *Plant Dis.* 90: 4-15
 15. Scholten OE, Lange W (2000) Breeding for resistance to rhizomania in sugar beet: A review. *Euphytica* 112: 219-231
 16. Tamada T, Baba T (1973) Beet necrotic yellow vein virus from rhizomania-affected sugar beet in Japan. *Ann. Phytopathol. Soc. Jpn.* 39: 325-332
 17. Wisler GC, Lewellen RT, Sears JL, Liu HY, Duffus JE (1999) Specificity of TAS-ELISA for beet necrotic yellow vein virus and its application for determining rhizomania resistance in field grown sugar beets. *Plant Dis.* 83: 864-870