

نشریه علمی- ترویجی یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
جلد ۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۳

زمان مناسب کنترل مهم‌ترين حشرات آفت کلزا

حسن براري

عضو هيات علمي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۶/۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۱۸

چکیده

برادی ح (۱۳۹۳) زمان مناسب کنترل مهم‌ترين حشرات آفت کلزا. نشریه علمی- ترویجی یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی .۲۵۴ - ۲۴۳: ۳.

در این تحقیق به منظور تعیین بهترین زمان کنترل حشرات آفت با استفاده از روش‌های مختلف نمونه‌برداری (از قبیل نسب تله‌های آبی زردرنگ، تله‌های فرمونی، تکانیدن غنچه و ساقه‌های انتهایی گیاه داخل سینی و همچنین جمع‌آوری مراحل نابالغ آفات از مزارع و پرورش آنها در شرایط آزمایشگاهی) دوره‌ی فعالیت تنفسی‌ای حشرات آفت در مزارع کلزای استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و مناسب‌ترین زمان کنترل آفات کلزا بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، تخم‌ریزی سرخرطومی‌های ساقه خوار کلزا و ورود لاروهای ریز به داخل بافت گیاه در آذرماه رخ داد، که زمان مناسب کنترل می‌باشد. دوره‌ی مبارزه با لاروهای ریز شب‌پرهی برگ‌خوار پنبه هم‌زمان با جوانه‌زنی کلزا در آبان تا نیمه‌ی آذرماه تعیین گردید. بهترین زمان کنترل کک‌های کلزا نیمه‌ی آبان‌ماه بدست آمد. برای کنترل سوسک گره‌خوار ریز کلزا در مناطق دشت (با ارتفاع کمتر از ۵۰۰ متر) در دهه‌ی آخر اسفندماه و در مناطق میان‌بند و ارتفاعات (به ترتیب با ارتفاع ۷۰۰-۵۰۰ و بیش از ۷۰۰ متر) در فروردین ماه باید اقدام گردد. در حال حاضر بقیه‌ی آفات کلزا از قبیل سوسک منداب، سفیده‌ی کلم، شته‌ها و زنبور شلغم در منطقه از اهمیت اقتصادی چندانی برخوردار نبوده و نیازی به کنترل ندارند.

واژه‌های کلیدی: حشرات آفت، زمان کنترل و کلزا.

مقدمه

هم در مرحله‌ی زایشی کلزا می‌توانند فعالیت تغذیه‌ای داشته باشند.

چندین گونه از حشرات در مزارع کلزای ایران فعالیت تغذیه‌ای دارند، لیکن فقط تعداد معددودی از آنها خسارت‌زا می‌باشد (۱ و ۲). حشرات کامل کک‌های کلزا با تغذیه از گیاه‌چه‌ها و جوانه‌های مرکزی کلزا در فصل پاییز موجب خسارت شدید می‌گردند (۱۰ و ۱۱). لارو سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا با تغذیه در داخل ساقه، طوقه و دمبرگ کلزا موجب خسارت می‌گردند (۶، ۱۳ و ۲۱). لارو شب‌پره‌های خانواده‌ی Noctuidae با رفتار همه چیزخواری، از برگ گیاهان مختلف تغذیه می‌کنند (۴). سوسک منداب از آفات مهم چلپائیان از جمله کلزا می‌باشد که حشره‌ی کامل و لارو آن برگ‌خوار هستند (۴). سوسک گرده‌خوار ریز، *Meligethes aeneus* (Col.: Nitidulidae) یکی از مهم‌ترین آفاتی است که حشرات کامل آن روی گل‌ها و لاروها در داخل غنچه‌های کلزا از گرده تغذیه می‌کنند (۱۶). در مدیریت کنترل آفات، پیش‌آگاهی و تعیین بهترین زمان کنترل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این کار می‌توان علاوه بر کنترل به موقع و مؤثرتر آفات، از کاربرد غیرضروری آفت‌کش‌ها، افزایش هزینه‌ی تولید و آلودگی محیط زیست کاست. به دلیل قدمت کم علم گیاه‌پژوهی کلزا در ایران، اطلاعات علمی- کاربردی اندکی برای کارشناسان و بهره‌برداران در خصوص

گیاه کلزا، *Brassica napus* L. به دلیل سازگاری با شرایط آب و هوایی مختلف، وجود درصد بالای روغن در دانه (۴۰-۴۸ درصد) و توانایی قرارگیری در تناب و با محصولات زراعی به ویژه غلات (۱۵ و ۱۸) نقش ویژه‌ای در کاهش وابستگی ایران به واردات روغن خوراکی دارد. علاوه بر مزایای فوق الذکر، قابلیت بکارگیری این گیاه به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری، مهم‌ترین عامل مؤثر در توسعه و پایداری کشت کلزا در استان‌های شمالی است. در دنیا، طیف وسیعی از حشرات با تغذیه از گیاه کلزا موجب خسارت می‌گردند (۶، ۷ و ۱۹). سوسک‌های معروف به کک‌های کلزا (*Phyllotreta* & *Psylliodes* spp. (Col.: Chrysomelidae: Alticinae)

سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا (*Ceuthorhynchus* spp. (Coleoptera: Curculionidae)، لارو برخی شب‌پره‌ها از خانواده‌ی Noctuidae و لارو زنبور برگ‌خوار از خانواده‌ی Tenthredinidae از آفات مرحله‌ی رویشی کلزا می‌باشد. مهم‌ترین آفات مرحله‌ی زایشی کلزا سوسک‌های گل‌خوار و متعلق به خانواده‌های Nitidulidae و Cetoniidae می‌باشد. البته حشرات دیگری، مانند شته‌ها (Aphidae) و سوسک منداب *Entomoscelis adonidis* (Col.: Chrysomelidae)، هم در مرحله‌ی رویشی و

مهرماه ۱۳۸۹ (هم‌زمان با جوانه‌زنی کلزا) با نصب تله‌های آبی زردنگ به قطر ۲۲ و عمق هشت سانتی‌متر (تا نیمه حاوی آب + چند قطره مایع شوینده) در مزارع کلزای بابل، نکا و ساری (دشت ناز و شویلاشت) اقدام به نمونه‌برداری گردید. در هر منطقه یک مزرعه یک هکتاری گردید. در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، برای انتخاب و در هر مزرعه تعداد چهار عدد تله نصب گردید. در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، برای جمع آوری سوسک گرده‌خوار ریز کلزا از تکانیدن گل آذین کلزا در داخل سینی سفیدرنگ و شمارش سوسک‌ها استفاده شد. در سال زراعی ۱۳۹۰-۹۱، جهت تعیین دوره‌ی فعالیت پروازی حشرات کامل سرخرطومی‌های ساقه خوار کلزا و زمان ورود آنها به مزارع کلزا، از ابتدای آبان‌ماه یک عدد تله‌ی آبی زردنگ روی سطح خاک مزرعه نصب و به‌طور هفتگی، تعداد سرخرطومی‌های شکار شده جمع آوری و شمارش گردیدند (۲۰). نمونه‌برداری تا نیمه‌ی خرداد ۱۳۹۱ (زمان رسیدن کلزا) ادامه داشت. به‌منظور تعیین طول دوره‌ی شفیرگی، لارو سرخرطومی‌های ساقه خوار کلزا در آزمایشگاه پرورش داده شدند (۲۰).

نتایج و بحث

زمان فعالیت حشرات گیاه‌خوار در مزارع کلزا نتایج حاصل از چندین سال بررسی آفات کلزا در استان مازندران نشان داد که بیش از ۲۰ گونه حشره روی کلزا در استان مازندران فعالیت تغذیه‌ای داشته که اکثر آنها از جمله

آفات مهم کلزا، دوره‌ی فعالیت و زمان مناسب کنترل آنها وجود دارد. در این مقاله با استناد به نتایج چندین پژوهه تحقیقاتی روی آفات کلزا در استان مازندران، سعی گردیده ضمن معرفی اجمالی مهم‌ترین حشرات آفت کلزا، دوره‌ی فعالیت تغذیه‌ای و زمان مناسب کنترل آنها شرح داده شود.

مواد و روش‌ها

به منظور تعیین زمان فعالیت حشرات آفت در مزارع کلزا، در طی سال‌های ۱۳۸۵-۹۱، از مزارع کلزا در مناطق مختلف استان مازندران (دشت، میان‌بند و ارتفاعات به ترتیب با ارتفاع کمتر از ۵۰۰، ۵۰۰-۷۰۰ و بیش از ۷۰۰ متر) بازدید و نمونه‌برداری گردید. در پاییز ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ لاروهای نوعی شب‌پره از مزارع کلزای مازندران جمع آوری و در آزمایشگاه پرورش داده شدند. پس از شناسایی حشرات کامل به عنوان برگ‌خوار پنه، از تله‌ی فرمون جنسی برای تعیین زمان فعالیت پروازی آنها در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ استفاده گردید. در اوایل آذر ماه ۱۳۸۸، نوعی لارو برگ‌خوار زنبور در مزارع کلزای بابل (منطقه‌ی قراخیل) و ساری (منطقه‌ی دشت ناز) مشاهده گردید. به منظور دستیابی به حشرات کامل، لاروهای این زنبور جمع آوری و در آزمایشگاه در داخل قفس‌های مخصوص پرورش حشرات و روی کلزای گلدانی پرورش داده شدند. برای بررسی فعالیت پروازی کک‌ها در مزارع کلزا، از اواخر

استان مازندران بر اساس زمان و مرحله‌ی رویشی کلزا تنظیم شده است. اکثر آفات کلزا در فصل پاییز و در مرحله‌ی رویشی کلزا موجب خسارت گردیدند که مهم‌ترین آنها لارو برگ‌خوار پنبه، حشرات کامل کک‌ها و سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا بودند (جدول ۱). سوسک گرده‌خوار ریز کلزا مهم‌ترین آفت کلزا در مرحله‌ی زایشی گیاه کلزا بود.

کک‌های کلزا، سرخرطومی‌های ساقه‌خوار، سوسک گرده‌خوار ریز کلزا، سوسک منداب، سوسک‌های گرده‌خوار بزرگ و کرم‌های مفتولی به راسته‌ی سوسک‌ها (Coleoptera) تعلق دارند. چند گونه نیز به راسته‌های بالپولکداران (Lepidoptera)، جوربالان (Homoptera)، ناجوربالان (Hemiptera) و بالغشانیان (Hymenoptera) تعلق دارند. در جدول ۱ دوره‌ی فعالیت تغذیه‌ای آفات کلزا در

جدول ۱- مقایسه‌ی زمان فعالیت تغذیه‌ای حشرات آفت با مراحل رشد و نمو کلزا در استان مازندران




۱: مرحله‌ی گیاهچه‌ای، ۲: مرحله‌ی ۴ تا ۱۰ برگی، ۳: دوره‌ی روزت، ۴: مرحله‌ی غنچه‌دهی و گل‌دهی، ۵: دوره‌ی تشکیل غلاف و رسیدن دانه

ساقه‌خوار کلزا که لاروهای آنها در داخل بافت گیاه کلزا فعالیت تغذیه‌ای دارند، وجود دارند که

سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا
در استان مازندران، سه گونه سرخرطومی

به اجرا درآید (۱۲). در طی فصل زمستان و اوایل بهار به دلیل نفوذ لاروهای در عمق بافت گیاه و به دنبال آن حضور حشرات مفید و گردهافشان در مزارع کلزا انجام عملیات کنترل شیمیایی از نظر فنی و زیست محیطی قابل توصیه نمی‌باشد. این سوسک‌ها تک نسلی هستند که خسارت اصلی به واسطه فعالیت تغذیه‌ای لاروهای آنها حادث می‌گردد (۶). مشاهدات مزرعه‌ای ما نشان داد که حشرات ماده در داخل رگبرگ، دمبرگ برگ‌های پایینی و یا در ناحیه طوقه بوته‌های جوان کلزا در اواخر پاییز و اوایل زمستان تخم‌ریزی می‌کنند. لاروهای سرخرطومی از اوخر فصل پاییز تا اوخر فوریدین در داخل بافت گیاه تغذیه می‌کنند. بر اثر واکنش گیاه، بافت گیاه در محل تخم‌ریزی گشته و رگبرگ اصلی چروک خورده، برگ‌های نزدیک طوقه خشک شده و در ناحیه دمبرگ که تورم و تغییر رنگ دیده می‌شود که عالیم اولیه‌ی خسارت آفت بوده و در پیش‌آگاهی آن حائز اهمیت می‌باشند. رشد لاروها به تدریج از اوایل بهار کامل شده، سپس بافت گیاه را ترک کرده و در داخل خاک تبدیل به شفیره می‌شوند. نتایج تحقیقات ما نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی، پس از حدود ۱۸ روز حشرات کامل سرخرطومی‌ها از شفیره‌ها بیرون می‌آیند. هم‌زمان با رسیدن کلزا، حشرات نسل جدید مزارع کلزا را ترک می‌کنند. این حشرات در زیر بقایای گیاهی

عبارتند از: *Ceutorhynchus picitarsis* و *C. chalybaeus* و *C. sulcicollis* (۱ و ۳). گونه‌ی *C. picitarsis* در اکثر مناطق کلزاکاری مازندران اعم از دشت، میان‌بند و ارتفاعات وجود دارد. گونه‌ی *C. chalybaeus* بیش‌تر در منطقه‌ی میان‌بند فعالیت دارد. گونه‌ی *C. sulcicollis* تنها گونه‌ای بود که علاوه بر منطقه‌ی میان‌بند از ارتفاعات نیز جمع‌آوری گردید. اولین حشرات کامل سرخرطومی‌ها در ۱۱ آبان‌ماه در تله‌ها شکار گردیدند. پیک پرواز در نهم آذر رخ داد و پس از آن تعداد شکار تله‌ها روند نزولی داشت تا اینکه در نیمه‌ی اول بهمن‌ماه به اتمام رسید (شکل ۱). تخم‌ریزی سرخرطومی‌ها در ناحیه‌ی طوقه و قاعده‌ی دمبرگ‌ها از اوایل آذر شروع و در نیمه‌ی آذر به اوج خود رسید. از نیمه‌ی بهمن ۱۳۹۰ تا نیمه‌ی اردیبهشت ۱۳۹۱ هیچ گونه حشره‌ی کاملی در تله‌ها شکار نگردید. خروج اولین حشرات کامل نسل جدید از مرحله‌ی شفیرگی و خاک از نیمه‌ی اردیبهشت ۱۳۹۱ شروع و تا نیمه خرداد، یعنی زمان برداشت کلزا، ادامه داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که زمان مناسب کنترل شیمیایی این آفت در منطقه‌ی مورد مطالعه اوسط آذرماه یعنی هم‌زمان با پیک فعالیت تخم‌ریزی حشرات ماده و ظهور لاروهای ریز قبل از ورود به عمق بافت گیاه می‌باشد. در واقع با مشاهده تخم‌ریزی سرخرطومی‌ها داخل طوقه بیش از ۲۰ درصد بوته‌های کلزا عملیات کنترل شیمیایی می‌بایستی




شکل ۱- تعداد سرخرطومی های ساقه خوار شکار شده در تله های آبی زردرنگ در تاریخ های مختلف نمونه برداری

عدد بود که پس از آن روند نزولی داشت و بعد از ۲۵ آذر هیچ شب پرهای در تله ها شکار نگردید (شکل ۲). نمونه برداری هفتگی با تله هی فرمونی در سال ۱۳۸۸ نشان داد که دوره ای فعالیت پروازی این آفت از اوایل مرداد تا ده سوم آذر می باشد. این شب پره دارای دو پیک کاملا مشخص بود: اولین و بزرگ ترین پیک (n=۳۰۳) در اوایل مهر (هم زمان با کشت کلزا) و دومین پیک (n=۱۸۸) در آبان (هم زمان با رویش کلزا) رخ داد. دوره ای مبارزه با لاروهای جوان این آفت هم زمان با جوانه زنی کلزا در آبان تا نیمه آذر ماه می باشد.

کک های کلزا
(Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae)
در سال زراعی ۱۳۸۹-۹۰، در تمام مناطق،
فعالیت پروازی کک ها از اولین هفته هی

حاشیه ای مزارع و در جنگل ها تابستان گذرانی کرده و پاییز وارد مزارع کلزا می شوند (۶).

لارو برگ خوار پنبه
Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae)
در سال ۱۳۸۵ از پرورش لاروهای جمع آوری شده از مزارع کلزای مازندران، حشرات کامل شب پرهی برگ خوار پنبه خارج شدند. در سال ۱۳۸۶، عملیات پرورش لاروها تکرار گردید که مجدداً تمامی شب پره های به دست آمده برگ خوار پنبه بودند. فعالیت پروازی این آفت در مزارع کلزای استان در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با نصب تله های فرمونی در بابل، ساری و نکا بررسی شد. در هفته اول پس از نصب تله ها (۲۰-۲۳ آبان)، تعداد زیادی برگ خوار پنبه شکار گردید که این تعداد در بابل، ساری و نکا به ترتیب ۶۰۷، ۶۳۵ و ۳۱۰



کاشت و روزهای گرم و آفتابی با وزش بادهای خشک در اوایل مراحل رویشی کلزا موجب افزایش خسارت این آفات می‌گردد. در صورت عدم بارندگی بعد از کشت کلزا، خسارت ککها روی کلزا درمناطق میان‌بند و ارتفاعات شدید خواهد بود. از آنجایی که حشرات کامل ککها فصول بهار و تابستان را در زیر بقایای گیاهی حاشیه مزارع، جنگلهای پیش‌زارها سپری می‌کنند، پیش‌ترین حشرات در پاییز از حاشیه مزارع رخ می‌دهد. بهترین زمان کنترل ککها نیمه آبان ماه می‌باشد.

سوسک گردخوار ریز کلزا

Meligethes aeneus (Col.: Nitidulidae)
سوسک گردخوار ریز کلزا در کلیه مزارع کلزای استان مازندران انتشار دارد. حشرات کامل هم‌زمان با غنچه‌دهی کلزا

نمونه‌برداری تا اواخر آذر (یعنی زمان چندبرگی شدن کلزا و شروع بارندگی و سرمای زمستانه) ادامه داشت. پیک فعالیت ککها در بابل، نکا، دشت ناز و شویلاشت نهاده شدند که فعالیت این حشرات در منطقه نکا بسیار پایین‌تر از نهاده شد. تاکنون نه گونه ای از ککها در استان مازندران از توزع گونه‌ای قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. تاکنون نه گونه ای از ککها در استان مازندران شناسایی شده‌اند (۲). حشرات کامل ککها کلزا از آفات مهم مرحله گیاهچه‌ای کلزا می‌باشند و بارزترین علایم خسارت آنها ایجاد سوراخ‌های ریز بر روی گیاهچه‌ها و برگ‌های اولیه در اوایل فصل پاییز می‌باشد. میزان خسارت ککها به شرایط آب و هوایی و نحوه مدیریت مزرعه بستگی دارد. رطوبت ناکافی در خاک، بستر نا مناسب

منطقه، کترل شیمیایی باید زمانی انجام گیرد که در مزرعه بیش از ۵۰ درصد ساقه‌ها در مرحله غنچه‌دهی بوده و کمتر از ۳۰ درصد این غنچه‌ها باز شده باشند و به طور متوسط هفت سوسک روی هر گیاه وجود داشته باشد. در استان مازندران، این آفت روی کلزای دیر کاشت و یا مزارعی که به هر دلیل فاز گل‌دهی آنها با تاخیر رخداده و با پیک پرواز سوسک‌ها مصادف شود خسارت‌زا می‌شود. اگر مزرعه در مرحله‌ی گل کامل باشد خسارت نمی‌بیند (۹).

سوسک منداب

Entomoscelis adonis

(Col.: Chrysomelidae)

حشرات کامل سوسک منداب در اواسط فصل پاییز به مزارع کلزای واقع در میان‌بند و ارتفاعات حمله می‌کند. در برخی سال‌ها به صورت لکه‌ای، به‌ویژه در مزارعی که از سطح سبز یکنواختی برخوردار نیستند، به شدت از برگ‌های کلزا تغذیه کرده و موجب خسارت می‌گردد. این سوسک در سطح خاک تخم‌ریزی کرده و لاروها به تعداد زیاد در طی فصل زمستان از برگ‌های کلزا تغذیه می‌کند. به علاوه تغذیه‌ی حشرات کامل سوسک منداب از غلاف‌های جوان

منطقه‌ی دشت یعنی در اوایل اسفندماه مشاهده شده و جمعیت آنها در اوایل اسفند و اوایل فروردین به اوج خود می‌رسد. هم حشره‌ی کامل وهم لارو سوسک گرده‌خوار ریز کلزا با تغذیه از گرده و غنچه‌ی گیاه کلزا موجب خسارت می‌گردد (۶ و ۱۴). این سوسک‌ها تک‌نسلی بوده و به صورت حشرات کامل در خارج از مزارع زیر بقایای گیاهی و پوستک درختان جنگلی زمستان گذرانی کرده و در اوایل زمستان و اوایل بهار به سوی مزارع کلزا پرواز می‌کنند. کلزا در مرحله غنچه‌دهی به خسارت این آفت خیلی حساس می‌باشد ولی بتدریج با رشد گیاه از میزان حساسیت آن کاسته می‌شود (۱۶ و ۱۷). حشرات کامل ضمن تغذیه از گرده‌ی گل‌ها، غنچه‌ها را نیز جویده و با ایجاد سوراخی به گرده جهت تغذیه رسیده و موجب خسارت می‌گردد. سوسک‌های ماده داخل سوراخ‌های ایجاد شده در قاعده‌ی غنچه‌ها تخم‌ریزی کرده و لاروها نیز داخل غنچه و گل از گرده و شهد تغذیه می‌کنند. لاروها پس از رشد کامل، برای شفیره شدن، گل‌های گیاه میزبان را ترک کرده، روی زمین افتاده و درون خاک شفیره می‌شوند و پس از حدود دو هفته حشرات کامل از خاک خارج می‌شوند. تراکم این آفت در مناطق میان‌بند و در مزارعی که در حاشیه‌ی جنگل‌ها و بیشه‌زارها قرار داشته و یا دیر به گل می‌روند بیش تر است (۱۴). با توجه به زیست‌شناسی آفت در

آفت به صورت لکه‌ای در برخی مزارع کلزای استان مازندران به ویژه در منطقه‌ی میان‌بند در اردیبهشت ماه دیده می‌شود و در حال حاضر از جمعیت کمی برخوردار است.

سفیده‌ی کلم

Pieris brassicae (Lep.: Pieridae)

لاروهای سفیده‌ی کلم در فروردین ماه از برگ‌های کلزا تغذیه می‌کند. این آفت به طور لکه‌ای در برخی مزارع کلزای قائم‌شهر، ساری و نکا مشاهده شد و آفت چندان مهمی در مازندران نمی‌باشد.

سوسک‌های گل‌خوار

Epicometis hirta و *Oxythyrea cinctella* (Col.: Cetoniidae)

حشرات کامل این سوسک‌ها از گرددی گل‌های گیاهان مختلف از جمله کلزا تغذیه می‌کنند. جمعیت این حشرات در مزارع کلزای واقع در میان‌بند و ارتفاعات به ویژه در مزارعی که در حاشیه‌ی جنگل‌ها واقع شده باشند بیشتر است. گاهی اوقات تراکم بالای این سوسک‌ها در مزارع دیر کاشت موجب از بین رفتن گل‌ها و غنچه‌های کلزا می‌گردد. این سوسک‌ها در مزارع واقع در دشت از اهمیت چندانی برخوردار نیستند زیرا جمعیت آنها اندک بوده و کلزا مرحله‌ی گل‌دهی را قبل از وقوع پیک پرواز آفت طی می‌کند.

کلزا در منطقه‌ی کیاسر در اوخر فروردین ماه مشاهده گردید. این حشره به تعداد زیادی از گیاهان خانواده‌ی چلپائیان حمله کرده و در مناطق مختلف کشور انتشار دارد (۴).

زنبور برگ‌خوار‌شلغم

Athalia rosae (Hym.: Tenthredinidae)

در سال ۱۳۸۸، از پرورش نوعی لارو برگ‌خوار زنبور جمع آوری شده از مزارع کلزای بابل و ساری حشرات کامل زنبور برگ‌خوار شلغم بدست آمد. خسارت این آفت علاوه بر کلزا، روی شلغم علوفه‌ای کشت شده در قائم‌شهر و روی تره تیزک در ساری شدید بود. لاروهای این آفت در مراحل اولیه‌ی رشد کلزا در فصل پاییز در مزارع کلزای منطقه دشت (از قبیل ساری، بابل، قائم‌شهر، جویبار و نکا) مشاهده گردیدند ولی در مزارع کلزای مناطق ارتفاعات دیده نشدند. این آفت به تعداد کم، از مزارع کلزای منطقه‌ی میان‌بند نیز جمع آوری گردید. این زنبور یکی از مهم‌ترین آفات کلزا در استان کردستان می‌باشد (۵).

شته مومنی کلم

Brevicoryne brassicae (Hom.: Aphidae)

مرحله‌ی گل‌دهی و تشکیل غلاف حساس‌ترین مرحله‌ی رشدی کلزا به حمله‌ی شته مومنی می‌باشد. این

سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا، آذرماه می‌باشد. یعنی با مشاهده‌ی تخم‌ریزی سرخرطومی‌ها روی دمبرگ و طوقه‌ی بیش از ۲۰ درصد بوته‌های کلزا عملیات کنترل شیمیابی باید به اجرا درآید. از آنجایی که همزمان با برداشت محصول کلزا، حشرات کامل سرخرطومی‌ها مزارع را ترک می‌کنند، بنابراین تناوب زراعی قابل توصیه نمی‌باشد.

از آنجایی که بیشترین پرواز شب‌پرهی برگ‌خوار پنبه در اوایل مهر و آبان ماه رخ می‌دهد، دوره‌ی فعالیت تغذیه‌ای لاروها همزمان با جوانه‌زنی کلزا در آبان‌ماه تا نیمه‌ی آذر خواهد بود. خسارت اولیه توسط لاروها ریز و در حاشیه و کناره‌های مزارع کلزا رخ می‌دهد. بنابراین لازم است در مراحل اولیه رشد کلزا (به‌ویژه در آبان‌ماه)، کناره‌های مزارع کلزا بازدید و بر علیه لاروها ریز کنترل صورت گیرد. این آفت در مزارع کلزای واقع در دشت خسارت می‌زند. بهترین زمان کنترل کک‌های کلزا نیمه‌ی آبان‌ماه می‌باشد. از آنجایی که گیاه کلزا در مرحله‌ی گیاهچه‌ای به خسارت کک‌ها بسیار حساس می‌باشد، لازم است در این مرحله مزارع مورد بازدید واقع شوند. مرحله‌ی غنچه‌دهی حساس‌ترین مرحله‌ی رویشی کلزا در مقابله خسارت سوسک گرده‌خوار ریز کلزا می‌باشد. کنترل شیمیابی این آفت باید زمانی انجام گیرد که در مزرعه بیش از ۵۰ درصد ساقه‌ها در مرحله غنچه‌دهی بوده و کمتر از ۳۰ درصد این غنچه‌ها بازشده باشند. برای مبارزه با

سن بذرخوار کلزا

Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae)

این آفت در واقع مستقیماً روی گیاه کلزا خسارت نمی‌زند بلکه با مکیدن شیره‌ی گیاه، باعث خسارت روی زراعت‌های بهاره و تابستانه و نهالستان‌های مجاور مزارع کلزا در فصل تابستان می‌گردد. در هنگام برداشت کلزا و پس از آن جمعیت سن‌های بذرخوار کلزا در زیر بقایای گیاهی بالا رفته و گاهی در اواخر بهار و تابستان به صورت گروهی به مزارع هم‌جوار از قبیل سویا و نهالستان‌های مرکبات حمله می‌کنند. در اوایل شهریور ۱۳۸۵ خسارت این حشره در یک باغ یکساله‌ی مرکبات واقع در جویبار و در تابستان ۱۳۸۹ در یک مزرعه‌ی سویا واقع در حومه‌ی شهرستان ساری مشاهده گردید.

کرم مفتولی

Coleoptera: Elateridae

در پاییز سال ۱۳۹۲، خسارت لاروسک‌های متعلق به خانواده التریده (Elateridae)، معروف به کرم مفتولی، در برخی مزارع کلزای ساری و میاندرون مشاهده گردید. در حال حاضر اطلاعاتی در زمینه تنوع گونه‌ای، زیست‌شناسی و پراکنش این آفت در منطقه وجود ندارد.

توصیه ترویجی

زمان مناسب کنترل شیمیابی

محیطی، نیازی به توصیه‌ی کنترل شیمیایی نمی‌باشد.

سپاسگزاری

این مقاله بخشنده از نتایج چندین پژوهشی تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوده که توسط نگارنده اجرا شده‌اند. بدینوسیله نگارنده از حمایت‌های مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران قدردانی می‌نماید.

این سوسمک باید حدود هفت حشره‌ی کامل روی هر گیاه در مرحله‌ی سبز متمایل به زرد بودن غنچه‌ها باشد. اگر هجوم آفت به مزرعه در مرحله‌ی گل کامل کلزا رخ دهد خسارت چندانی وارد نشده و نیازی به کنترل نخواهد بود. احتمال خسارت این آفت در مزارع دیر کاشت، به دلیل هم‌زمانی غنچه‌دهی گیاه با بیشترین پرواز آفت، بیش‌تر نخواهد بود. در حال حاضر بقیه‌ی آفات کلزا در استان مازندران از اهمیت اقتصادی چندانی برخوردار نبوده و در اکثر موارد در راستای حفظ دشمنان طبیعی و کاهش آلودگی‌های زیست

منابع

- براری ح، الزيارگ (۱۳۸۲) پژوهش و شناسایی سه گونه جدید سرخرطومی ساقه‌خوار کلزا از استان مازندران. صفحه ۹۰. هجددهمین کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران ۶-۳ شهریورماه، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
- براری ح، سری س (۱۳۸۹) بررسی سوسمک‌های برگ‌خوار و ساقه‌خوار کلزا در استان مازندران. صفحه ۶۰۳. نوزدهمین کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران ۱۲-۹ مرداد، مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ایران
- براری ح، مافی ش (۱۳۸۷) سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا، نشریه‌ی ترویجی شماره ۵/۲۱۱/۸۷ سازمان جهاد کشاورزی مازندران. ۱۰ صفحه
- خانجانی م (۱۳۸۴) آفات گیاهان زراعی ایران. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ۷۳۱ صفحه
- کمانگر ص (۱۳۹۲) بررسی تأثیر حشره‌کش‌های گاچو و کروزر به صورت تیمار بذور کلزا در کنترل زنبور برگ‌خوار کلزا (*Athalia rosae* (Hym. Tenthredinidae) مجله‌ی علمی کشاورزی گیاه‌پزشکی (۲): ۳۶-۱
- Alford D, Nilsson V, Ulber B(2003) Insect pests of oilseed rape crops. In: Alford DV (ed) Biocontrol of Oilseed Rape Pests. Blackwell Science, Oxford, pp 9-41
- Barari H (2005) Ecology of the coleopteran stem-mining pests and their parasitoids

- in winter oilseed rape: implications for integrated pest management. Doctoral dissertation. Imperial College, University of London
- 8. **Barari H, Cook SM, Clark SJ, Williams IH (2004)** Rearing and identification of the larval parasitoids of *Psylliodes chrysocephala* and *Ceutorhynchus pallidactylus* from field-collected specimens. Bulletin of IOBC/wprs Integrated Control in Oilseed Crops.27 (10): 263-271
 - 9. **Berger HK (1987)** Establishment economic thresholds for pests in rape crops with the aid of yellow pans. Pflanzenschutz. 3: 7-11
 - 10. **Cox ML (1998)** The genus *Psylliodes Latrielle* (Chrysomelidae: Alticinae) in the UK. Coleopts. 2: 33-65
 - 11. **Ferguson AW, Barari H, Warner DJ, Campbell JM, Smith ET, PWatts N, Williams IH (2006)** Distributions and interactions of the stem miners *Psylliodes chrysocephala* and *Ceutorhynchus pallidactylus* and their parasitoids in a crop of winter oilseed rape (*Brassica napus*). Entomol. Exp. Appl. 119: 81–92
 - 12. **Indic D, Vukovic S, Grahovac M, Bursic V, Sunjka D (2009)** Problems in *Ceuthorrhynchus* spp. control on rapeseed in the region of Serbia. Pesticides and Phytomedicina. 24(4): 309-313
 - 13. **Keyhaneyan A, Barari H (2010)** Report of cabbage stem weevil, *Ceutorhynchus pallidactylus* (Col.: Curculionidae) on oilseed rape from Iran. J. Entom. Soc. Iran. 30(1): 61-62
 - 14. **Lane A (1984)** Oilseed rape handbook. The open university Press Walton Hall, Milton Keynes. 70pp
 - 15. **MitrovicP, Milovac Z, Marinkovic R (2009)** Current problems in the protection of winter rapeseed (*Brassica napus* var. *napus* L.). Zastita bilja (Plant Protection), 60 (2): 127-144
 - 16. **Nilsson C (1995)** Pollen beetles (*Meligethes* spp.) in oilseed rape crops (*Brassica napus* L.): biological interaction and crop losses. Doctoral dissertation. Swedish University of Agricultural Sciences
 - 17. **Nilsson C (1988)** The pollen beetle (*Meligethes aeneus*) in winter and spring rape at Alnarp 1976-1978. I: migration and sex ratio. Växtskyddsnotiser 52: 134-138
 - 18. **Schone F (1998)** Rapeseed and rape products in the food sector and as a feed-quality regime and developments in Thuringia. Ber. Landwirtsch76: 441-457
 - 19. **Williams IH (2004)** Advances in insect pest management of oilseed rape in Europe. In Horowitz AR, Ishaaya I (eds) Insect Pest Management. Springer–Verlag, Berlin, pp 181-208
 - 20. **Williams IH (2010)** The major insect pests of oilseed rape in Europe and their management. In Williams IH (ed)Biocontrol-Based Integrated Management of Oilseed Rape Pests.Springer Science+Business Media,pp 1-45
 - 21. **Winfield AL (1992)** Management of oilseed rape pests in Europe. Agri. Zoology Rev. 5: 51-95